

EPIDEMIE GASTRO-ENTERITE à NOROVIRUS

Désinfection des mains	<ul style="list-style-type: none"> Désinfection des mains avec une solution hydro-alcoolique à base d'éthanol comme par exemple : Stérillium Virugard, Skinman Intensiv, Softa-Man acute, Desderman N
Désinfection de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> Dismozon (oxygène actif) ou Eau de javel 2% (à diluer pour atteindre une concentration de 0,5% à 1%) pour le nettoyage des surfaces mobiles et fixes y compris les sanitaires Désinfection biquotidienne
Traitement du linge	<ul style="list-style-type: none"> Le linge sera transporté dans un sac en plastique, imperméable et hermétiquement fermé. Il sera lavé en machine à une température > à 60°C. Les textiles ne pouvant être lavés à de hautes températures seront trempés dans un produit désinfectant actif contre le norovirus ou entreposés séparément pendant 14 jours dans le sac hermétiquement fermé.
Isolement de contact	<ul style="list-style-type: none"> Maintien du résident en chambre Maintien de l'isolement de contact 5 jours minimum ou 48h après l'arrêt des symptômes
Mesures pour le personnel	<ul style="list-style-type: none"> Eviction immédiate de tout personnel présentant des symptômes de gastro-entérite jusqu'à 48 h. après la fin des symptômes
Déclaration de l'épidémie	<p>Annoncer l'épidémie au médecin cantonal Avertir la cellule régionale HPCI</p>